


Zamojski (EE 1044)

N: Zamojski Tümmler, F: Culbutant de Zamosc, A: Zamoy Tumbler



Pochodzenie:

Zamość i pobliskie miejscowości południowo-wschodniej Polski, na przełomie XVII - XVIII wieku. Rasa ta wyhodowana została z licznych krzyżówek miejscowych gołębi lotnych z gołębiami przywiezionymi z dawnej Persji. Gołębie te przed wydaniem wzorca ze względu na swoje zdolności lotne nazywano górniami. Rasa ta po 1945 roku rozpowszechniła się na cały kraj. Uszlachetniona przez hodowców z Lubelszczyzny. Obecnie hodowany jest na terenie całego kraju. Główny ośrodek hodowlany to Zamość i okolice.

Wrażenie ogólne:

Gołąb średniej wielkości typu lotnego o wydłużonej sylwetce, gładkogłowy lub z czubkiem, jednokolorowy lub pstry, na mniej niż średniej długości nogach, z uniesioną piersią i lotkami noszonymi na dość długim ogonie. Ptak o żywym usposobieniu.

Cechy rasowości:

Głowa:

Lekko wydłużona, średniej wielkości, czoło wypukłe, dość wysokie z lekko płaskim ciemieniem, gładkogłowe lub z czubkiem w kształcie stożka.

Oczy:

Duże, jasne, ciemne u białych.

Brwi:

Dwurzędowe, jasne, cienkie.

Lotne 2025

1

Zamojski (EE 1044)

Zamojski (EE 1044)

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dziób: | Średniej długości proporcjonalny do wielkości głowy, jasny, dopuszczalna niewielka ciemna plamka "muszka" na górnej części dzioba u gołębi o umaszczeniu czarnym, niebieskim, niebieskim grochowym i pstrych w tym kolorze. Tworzy z czołem kąt rozwarty. Przedłużenie szpary dziobowej przebiega przez dolną krawędź oka. Woskówki małe, przylegające, biało przypudrowane. |
| Szyja: | Średniej długości, dość silna, podgardle łagodnie wykrojone i zaokrąglone. U czubatych z tyłu szyi tworzy się grzywa. Wierzchołek czubka sięga linii będącej przedłużeniem szpary dziobowej i przechodzącej przez dolną krawędź oka. |
| Pierś: | Nie za szeroka, wypukła, wysunięta do przodu, lekko uniesiona. |
| Plecy: | Nie za szerokie, wydłużone, lekko ukośnie opadające. |
| Skrzydła: | Mocne, dobrze przylegające, lotki noszone na ogonie, nieco krótsze od ogona. Preferuje się tzw. "żagle", utworzone z lotek pierwszego rzędu, wystających ponad linię pleców. |
| Ogon: | Dość długi, lekko rozszerzający się przy końcu, noszony w jednej linii z linią pleców. Dopuszcza się lekko daszkowaty ogon. |
| Nogi: | Mniej niż średniej długości (podudzia lekko widoczne), skoki i palce nieupierzone, pazurki jasne. |
| Upierzenie: | Zwarte, dobrze przylegające. |

Rodzaje kolorów

Jednokolorowe: białe, czarne, czerwone, kawowe, żółte, niebieskie z pasami, niebiesko-grochowe.

Białolote: w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, kawowym, niebieskim z pasami, niebieskim grochowym.

Mnichy (tzw. szkaplerzaki): w kolorze niebieskim z pasami, niebieskim grochowym, czarnym, czerwonym, czerwono-płowym.

Pstre w kolorze czarnym, czerwonym, kawowym, niebieskim i żółtym.

Kolor i rysunek

Wszystkie kolory czyste i nasycone, z zielono-metalicznym połyskiem na szyi.

Białolote we wszystkich kolorach: 8 - 10 białych lotek pierwszego rzędu. Pozostałe upierzenie jest kolorowe.

Mnich (szkaplerzak) Wszystkie kolory są czyste i nasycone. Biała jest głowa, kark, oraz dość szeroki i głęboki śliniak sięgający do połowy przedniej części szyi. Brzuch z klinem ogona, kuper, sterówki i od 8 do 10 lotek I rzędu są białe, pozostała część upierzenia jest kolorowa.

U pstrych występują większe skupiska barwnych piór.

Zamojski (EE 1044)

Duże wady

Nieprawidłowe proporcje poszczególnych części ciała. Duża, kostkowa głowa, płaskie czoło, oczy: cięte, łamane - bez przewagi ciemnego koloru tęczówki; jedno oko jasne, drugie cięte z przewagą koloru jasnego, brwi różowe, nieprawidłowa długość dzioba, skrzydła noszone pod ogonem, , inny kolor pazurków, szeroki czubek. U białołotych mniej niż 6 lub więcej niż 10 białych lotek w skrzydle, różnica większa niż dwie białe lotki między skrzydłami. U mnicha: mniej niż 8 białych lotek I rzędu, więcej niż 3 białe lotki II rzędu, różnica większa niż 2 białe lotki między skrzydłami.

Dane do oceny

Wygląd ogólny- budowa- postawa- głowa, kształt czubka- oczy, brwi- kolor i rysunek.

Obrączka numer 7